

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 8. Янусь несимметричный,
Cephalothoracopagus monosymmetros.

Болѣ развитую вторичную переднюю поверхность обозначаемъ буквой А; менѣ развитую — В. Разсматривая препаратъ со стороны вторичной передней поверхности А, мы видимъ двѣ индивидуальныя части: I — правая и II — лѣвая. Разсматривая со стороны вторичной передней поверхности В, мы находимъ I — съ лѣвой стороны и II — съ правой.

Индивидуальныя части развиты хорошо, но не вполне равномерно, что особенно замѣтно на лицѣ. Индивидуальная часть I имѣетъ 31,0 см. длины. Верхнія и нижнія конечности ея развиты нормально; полъ женскій, ясно обозначенъ; есть заднепроходное отверстіе. — Индивидуальная часть II имѣетъ 30,0 см. длины и во всемъ перечисленномъ идентична I. Окружность общей головы 33,0 см. Наибольшій затылочный размѣръ 115 мм. Наибольшій лобный діаметръ 72 мм.

Вторичное лицо А развито хорошо и представляетъ слѣдующія особенности. Глаза сдвинуты нѣсколько болѣе, чѣмъ нормально; разстояніе между внутренними углами ихъ 8 мм.; разстояніе между наружными углами 29 мм. Носъ плоскій; ширина носовыхъ крыльевъ 14 мм. Носовыя отверстія нормально открыты, и носовая перегородка нормальной ширины. Ротовое отверстіе имѣетъ видъ горизонтальной щели длиной 12 мм. Ушныя раковины нѣсколько наклонены, особенно правая; длина ихъ одинакова — 19 мм. Грудная и брюшная поверхности А развиты хорошо. Разстояніе между сосками 24 мм.

Вторичное лицо В развито хуже. Глаза сближены больше; разстояніе между внутренними углами ихъ 6 мм.; разстояніе между наружными углами 25 мм. Носъ совершенно плоскій, ширина 13 мм. Носовыя отверстія прикрыты и узки; носовая перегородка узка. Ротовая щель имѣетъ видъ круглаго отверстія 2 мм. въ діаметрѣ. Ушныя раковины наклонены больше, чѣмъ на А, особенно лѣвая (I). Длина ихъ: лѣвая (I) 22 мм., правая (II) 21 мм. Грудная и брюшная поверхности В развиты довольно хорошо. Разстояніе между сосками 23 мм.

Пупокъ имѣетъ типичное положеніе у нижней границы сліянія индивидуальныхъ частей.

Препаратъ вскрытъ снизу. Происхожденіе его неизвѣстно.

— II —
Индивидуальная часть I.



Вторичная передняя поверхность А.

Индивидуальная часть II.
Индивидуальная часть II.



Вторичная передняя поверхность В.

Рис. 8 и 9. Препарат № 8. *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

Индивидуальная часть I.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 9. Янусь несимметричный, *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

Обозначеніе вторичныхъ поверхностей и индивидуальныхъ частей, какъ у № 8-го. Индивидуальная часть I имѣетъ въ длину 29,0 см.; верхнія и нижнія конечности развиты нормально; полъ не обозначенъ. На внутренней поверхности бедеръ, соотвѣтственно паховой складкѣ, расположены на разномъ уровнѣ довольно высокія складки кожи, напоминающія большія половыя губы. Въ промежностной области имѣется большое отверстіе, ведущее, повидимому, въ мочевые пути; однако, возможно, что это есть и заднепроходное отверстіе. Индивидуальная часть II имѣетъ въ длину 29,0 см. Верхнія конечности нормальны. Нижнія—нѣсколько изуродованы въ голеностопномъ суставѣ: правая—*pes equinus*, лѣвая—*pes vagus*. Полъ не обозначенъ. Соотвѣтственно наружнымъ половымъ органамъ имѣется высокій двойной кожный бугорокъ, мягкій на ощупь. Сзади, у его основанія лежитъ круглое отверстіе, мочеполовое или заднепроходное,—рѣшить наружнымъ изслѣдованіемъ нельзя. Окружность общей головы 37,0. Наибольшій затылочный діаметръ 133 мм.; наибольшій лобный размѣръ 87 мм.

Вторичное лицо А развито хорошо. Глазныя щели расположены почти нормально; разстояніе между внутренними углами 10 мм.; разстояніе между наружными углами 32 мм. Носъ имѣетъ почти нормальный видъ; носовая перегородка широкая; ноздри открыты и обращены нѣсколько впередъ. Ротовая щель нормальна, около 14 мм. длины; во рту виденъ языкъ. Ушныя раковины наклонены нижними концами къ срединной линіи (конвергируютъ); размѣры длины ихъ: правой—29 мм., лѣвой—30 мм. Впереди верхней трети правой раковины виситъ кожный сосковидный придатокъ 10 мм. длины. Грудная и брюшная поверхности А развиты хорошо. Разстояніе между сосками 33 мм.

Вторичное лицо В развито хуже. Глазныя щели сближены сверхъ нормы, наружные углы ихъ опущены книзу. Разстояніе между внутренними углами 8 мм.; разстояніе между наружными углами 26 мм. Носъ плоскій, широкій и оканчивается непарнымъ узкимъ отверстіемъ. Ротъ имѣетъ видъ круглаго отверстія, прикрытаго языкообразной кожной складкой. Ушныя раковины сдвинуты къ шеѣ и значительно конвергируютъ нижними концами. Размѣры ихъ одинаковы—33 мм. Грудная и брюшная поверхности В развиты довольно хорошо. Разстояніе между сосками 29 мм.

Пупокъ имѣетъ типичное положеніе у нижней границы сліянія индивидуальныхъ частей. Нижній отдѣлъ брюшныхъ стѣнокъ открытъ и черезъ него вываливается часть внутренностей.

Препаратъ не вскрытъ. Происхожденіе неизвѣстно.



Вторичная передняя поверхность А.



Вторичная передняя поверхность В.

Рис. 10 и 11. Препарат № 9. *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 10. Янусь несимметричный,
Cephalothoracopagus monosymmetros.

Обозначеніе вторичныхъ поверхностей и индивидуальныхъ частей то же, что у № 8. Индивидуальныя части развиты хорошо, но не вполне симметрично. Индивидуальная часть I имѣетъ въ длину 26,0 см. Верхнія и нижнія конечности развиты нормально. Полъ не обозначенъ. Заднепроходное отверстіе отсутствуетъ. На внутренней поверхности праваго бедра вверху имѣется небольшой кожный придатокъ около 8 мм. въ длину. Индивидуальная часть II имѣетъ въ длину 26,0 см. Верхнія и нижнія конечности нормальны; половые органы и заднепроходное отверстіе отсутствуютъ. На внутренней поверхности праваго бедра такой-же кожный придатокъ, какъ и у I. Окружность общей головы 33,0 см. Наибольшій затылочный діаметръ 112 мм. Наибольшій лобный — 80 мм.

Вторичное лицо А развито хорошо. Глазныя щели нормальны. Разстояніе между внутренними углами глазъ 7 мм.; разстояніе между наружными углами 28 мм. Носъ, ноздри и носовая перегородка нормальны. Ротовая щель развита хорошо; ширина ея 12 мм. Правая ушная раковина недоразвита вверху; лѣвая почти нормальна. Разница въ размѣрахъ очевидна, но трудно опредѣлима вслѣдствіе недоразвитія правой раковины. Грудная и брюшная поверхности развиты хорошо. Разстояніе между сосками, повидимому, 25 мм.

Вторичное лицо В недоразвито. Единственная глазная щель въ формѣ креста имѣетъ въ ширину 9 мм. Надъ ней расположенъ хоботообразный придатокъ около 20 мм. въ длину. Ротовое отверстіе имѣетъ видъ круглой щели и прикрыто кожнымъ язычкомъ. Ушныя раковины болѣе или менѣе нормальны; лѣвая имѣетъ въ длину 20 мм., правая — 23 мм. Грудная и брюшная поверхности развиты удовлетворительно. Разстояніе между сосками, повидимому, 23 мм.

Расположеніе пупка типичное. Въ нижнемъ отдѣлѣ грудной полости имѣется громадное отверстіе, черезъ которое вывалились внутренности. Препаратъ вскрытъ и зашитъ, вслѣдствіе чего разстояніе между сосками возможно опредѣлить лишь приблизительно. Происхожденіе неизвѣстно.

Индивидуальная часть I.



Индивидуальная часть II.

II часть индивидуальной



Индивидуальная часть I.

Вторичная передняя поверхность А.

Вторичная передняя поверхность В.

Рис. 12 и 13. Препарат № 10. *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 11. Янусь несимметричный, *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

Обозначеніе вторичныхъ поверхностей и индивидуальныхъ частей то же, что у № 8-го. Индивидуальныя части развиты хорошо, но не вполне симметричны. Индивидуальная часть I имѣетъ въ длину 31,0 см. Верхнія и нижнія конечности развиты нормально. Въ крестцовой области имѣется твердый сосковидный придатокъ около 5 мм. длины и 10 мм. ширины у основанія. Полъ женскій, ясно обозначенъ. Заднепроходное отверстіе есть.

Индивидуальная часть II имѣетъ въ длину 34,0 см. Верхнія и нижнія конечности нормальны. Въ крестцовой области имѣется небольшое углубленіе (fovea cossugea), расположенное на едва замѣтномъ возвышеніи. Половые органы и заднепроходное отверстіе, какъ у I. Окружность общей головы 31,5 см. Наибольшій затылочный діаметръ 106 мм. Наибольшій лобный — 70 мм.

Вторичное лицо А развито хорошо. Глазныя щели расположены нормально. Разстояніе между внутренними углами 10 мм.; разстояніе между наружными углами 30 мм. Носъ имѣетъ нормальный видъ; тоже надо сказать о ноздряхъ и носовой перегородкѣ. Ротовая щель сравнительно мала, имѣетъ въ длину 10 мм. Ушныя раковины расположены почти нормально, съ незначительной конвергенціей нижнихъ концовъ; длина правой — 19 мм.; длина лѣвой — 21 мм. Грудная и брюшная поверхности развиты хорошо. Разстояніе между сосками 31 мм.

Вторичное лицо В имѣетъ признаки недоразвитія. Глазныя щели слились въ одну ромбовидной формы ямку, на днѣ которой виденъ единственный глазъ. Ширина глазной щели 9 мм. Надъ глазомъ расположенъ хоботообразный придатокъ около 15 мм. длиной. Въмѣсто ротовой щели имѣется едва замѣтное точечное углубленіе. Ушныя раковины сдвинуты на шею и соприкасаются своими нижними концами. Длина каждой изъ нихъ 21 мм. Общая ширина ихъ 42 мм. Грудная и брюшная поверхности развиты удовлетворительно. Разстояніе между сосками 27 мм.

Расположеніе пупка типичное. Препаратъ не вскрытъ. Происхожденіе неизвѣстно.

Индивидуальная часть I.



Индивидуальная часть II.

Индивидуальная часть II.



Индивидуальная часть I.

Вторичная передняя поверхность А.

Вторичная передняя поверхность В.

Рис. 14 и 15. Препарат № 11. *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 12. Янусъ несимметричный,
Cephalothoracopagus monosymmetros.

Обозначение вторичныхъ поверхностей и индивидуальныхъ частей то же, что у № 8. Индивидуальныя части развиты хорошо, но несимметрично. Индивидуальная часть I имѣетъ въ длину 32,0 см. Верхнія и нижнія конечности развиты нормально. Полъ женскій, ясно выраженъ; заднепроходное отверстіе есть. Въ крестцовой области небольшое углубленіе (fovea соссугеа). Индивидуальная часть II имѣетъ въ длину 32,0 см. Верхнія и нижнія конечности развиты хорошо. Полъ женскій, ясно выраженъ; заднепроходное отверстіе есть. Въ крестцовой области слабо развитая fovea соссугеа. Окружность общей головы 30,0 см. Наибольшій затылочный діаметръ 102 мм. Наибольшій лобный діаметръ 74 мм.

Вторичное лицо А развито хорошо. Расположеніе глазныхъ щелей почти нормальное. Разстояніе между внутренними углами ихъ 8 мм. Разстояніе между наружными углами 24 мм. Носъ широкій, приплюснутый, въ общемъ нормальный. Ротовая щель имѣетъ въ ширину 10 мм. Ушные раковины расположены нормально; длина ихъ одинакова—около 20 мм. Грудная и брюшная поверхности развиты хорошо. Разстояніе между сосками приблизительно 28 мм.


Вторичное лицо В недоразвито. Глазная щель въ формѣ креста имѣетъ 10 мм. ширины. Надъ ней расположенъ небольшой кожный хоботокъ въ 4 мм. длиной. Ротовое отверстіе съ хорошо выраженной верхней губой помещается у самой шеи и имѣетъ круглую форму, съ діаметромъ въ 3 мм. Ушные раковины—около 20 мм. каждая—расположены почти нормально съ незначительной конвергенціей нижнихъ концовъ. Грудная и брюшная поверхности развиты хорошо. Разстояніе между сосками, повидимому, 30 мм.

Расположеніе пупка типичное. Препараты вскрыты и зашиты, вслѣдствіе чего размѣры разстояній между сосками нельзя считать дѣйствительными. Происхожденіе неизвѣстно.

— 27 —
Индивидуальная часть I.



Индивидуальная часть II.
Индивидуальная часть II.



Индивидуальная часть I.

Вторичная передняя поверхность А.

Вторичная передняя поверхность В.

Рис. 16 и 17. Препарат № 12. *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 13. Янусъ несимметричный,
Cephalothoracopagus monosymmetros.

Обозначеніе вторичныхъ поверхностей и индивидуальныхъ частей то же, что у № 8-го. Индивидуальныя части развиты хорошо, но несимметрично. Индивидуальная часть I имѣетъ въ длину 32,0 см. Верхнія и нижнія конечности развиты нормально. Полъ женскій, хорошо обозначенъ; заднепроходное отверстіе есть. Индивидуальная часть II имѣетъ въ длину 32,0 см. Конечности, половые органы и заднепроходное отверстіе, какъ у I. Окружность общей головы 30,0 см. Наибольшій затылочный діаметръ 98 мм. Наибольшій лобный — 79 мм.

Вторичное лицо А развито хорошо, кромѣ нижней губы и подбородка, которые нѣсколько недоразвиты. Глазныя щели нормальны. Разстояніе между внутренними углами 13 мм.; между наружными — 34 мм. Носъ и ушныя раковины нормальны. Ротовая щель сравнительно узка — 10 мм. Нижняя губа тонка и какъ бы втянута въ ротъ. Величина ушныхъ раковинъ одинакова — 22 мм. Грудная и брюшная поверхности хорошо выражены. Разстояніе между сосками, повидимому, 33 мм.

Вторичное лицо В сильно недоразвито: отсутствуютъ ротъ, носъ и глаза. На мѣстѣ циклопическаго (одного) глаза имѣется коническій бугорокъ съ точечнымъ отверстіемъ. Ушныя раковины лежатъ на шеѣ у срединной линіи и срослись нижними своими концами. Длина лѣвой раковины 16 мм., правой — 19 мм. Наибольшая ширина ихъ 27 мм. Грудная и брюшная поверхности недоразвиты въ сравненіи съ А. Разстояніе между сосками, повидимому, 29 мм.

Расположеніе пупка типичное. Препараты вскрыты и зашиты, вслѣдствіе чего цифры, выражающія разстояніе между сосками, неточны. Происхожденіе неизвѣстно.

— 31 —
Индивидуальная часть I.



Индивидуальная часть II.
II часть вентральной части




Индивидуальная часть I.

Вторичная передняя поверхность А.

Вторичная передняя поверхность В.

Рис. 18 и 19. Препарат № 13. *Cephalothoracopagus monosymmetros*.



ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 14. Янусь несимметричный,
Cephalothoracopagus monosymmetros.

Обозначеніе вторичныхъ поверхностей и индивидуальныхъ частей, какъ у № 8-го. Индивидуальныя части развиты хорошо, но несимметрично. Индивидуальная часть I имѣетъ въ длину 34,5 см. Верхнія и нижнія конечности нормальны. Полъ женскій; заднепроходное отверстіе есть. Индивидуальная часть II имѣетъ въ длину 34,5 см. Верхнія и нижнія конечности, половые органы и заднепроходное отверстіе, какъ у I. Окружность общей головы 32,0 см. Наибольшій затылочный діаметръ 110 мм. Наибольшій лобный діаметръ 81 мм.

Вторичное лицо А развито хорошо. Глазныя щели, носъ, ротъ нормальны. Разстояніе между внутренними углами глазъ 12 мм. Разстояніе между наружными углами 31 мм. Ротовое отверстіе имѣетъ въ ширину 9 мм. Ушныя раковины нѣсколько недоразвиты въ верхнихъ своихъ частяхъ и имѣютъ одинаковую длину — 19 мм. Грудная и брюшная поверхности хорошо развиты. Разстояніе между сосками 35 мм.

Вторичное лицо В сильно редуцировано — имѣетъ лишь ушныя раковины, соприкасающіяся своими нижними концами и расположенныя на границѣ шеи по срединной плоскости. Длина каждой изъ нихъ 21 мм. Наибольшая ширина ихъ 24 мм. Грудная и брюшная поверхности развиты слабѣе I. Разстояніе между сосками 27 мм.

Расположеніе пупка типичное. Препараты не вскрыты. Происхожденіе неизвѣстно.

Индивидуальная часть I.



Индивидуальная часть II.

Индивидуальная часть II.



Индивидуальная часть I.

Вторичная передняя поверхность А.

Вторичная передняя поверхность В.

Рис. 20 и 21. Препарат № 14. *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 15. Янусъ несимметричный,
Cephalothoracopagus monosymmetros.

Обозначеніе вторичныхъ поверхностей и индивидуальныхъ частей, какъ у № 8-го. Индивидуальныя части развиты хорошо, но несимметрично. Индивидуальная часть I имѣетъ въ длину 32,5 см. Верхнія и нижнія конечности нормальны. Полъ женскій. Заднепроходное отверстіе есть. Индивидуальная часть II имѣетъ въ длину 33,5 см. Верхнія и нижнія конечности, половые органы и заднепроходное отверстіе, какъ у I. Окружность общей головы 30,0 см. Наибольшій затылочный діаметръ 94 мм. Наибольшій лобный — 91 мм.

Вторичное лицо А имѣетъ видъ совершенно нормальный. Разстояніе между внутренними углами глазъ 14 мм.; разстояніе между наружными углами 35 мм. Ширина ротового отверстія 14 мм. Длина правой ушной раковины 14 мм.; длина лѣвой ушной раковины 18 мм. Грудная и брюшная поверхности развиты очень хорошо и выпуклы. Разстояніе между сосками 35 мм.

Вторичное лицо В сильно редуцировано. Изъ органовъ его имѣются только ушныя раковины, спустившіяся на шею; верхніе и нижніе концы ихъ соприкасаются и начали срастаться. Длина лѣвой раковины 22 мм., правой — 24 мм. Наибольшая ширина ихъ 35 мм. Грудная и брюшная поверхности развиты нѣсколько хуже, чѣмъ у А. Разстояніе между сосками 31 мм.

Расположеніе пупка типично. Препараты не вскрыты. Происхожденіе неизвѣстно.

— 39 —
Индивидуальная часть I.



Индивидуальная часть II.
II часть ментальности



Индивидуальная часть I.

Вторичная передняя поверхность А.

Вторичная передняя поверхность В.

Рис. 22 и 23. Препарат № 15. *Cephalothoracopagus tomosymmetros*.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 16. Янусъ несимметричный,
Cephalothoracopagus monosymmetros.

Обозначеніе вторичныхъ поверхностей и индивидуальныхъ частей, какъ у № 8-го. Индивидуальныя части развиты нормально, но несимметрично. Индивидуальная часть I имѣетъ въ длину 31,0 см. Верхнія и нижнія конечности нормальны. Полъ мужской, заднепроходное отверстіе есть. — Индивидуальная часть II имѣетъ въ длину 31,0 см. Верхнія и нижнія конечности, половыя органы и заднепроходное отверстіе какъ у I. Окружность общей головы 30,5 см. Наибольшій затылочный діаметръ 89 мм. Наибольшій лобный — 88 мм.

Вторичное лицо А развито хорошо, всѣ части его нормальны. Разстояніе между внутренними углами глазъ 16 мм. Разстояніе между наружными углами 38 мм. Ширина ротовой щели 14 мм. Длина ушныхъ раковинъ 24 мм. Грудная и брюшная поверхности развиты очень хорошо и выпуклы. Разстояніе между сосками 33 мм.

Вторичное лицо В сильно недоразвито и покрыто волосами вплоть до ушныхъ раковинъ. Всѣ части на немъ, кромѣ этихъ послѣднихъ, отсутствуютъ. Ушныя раковины находятся почти на шеѣ и соприкасаются своими внутренними краями какъ вверху, такъ и внизу; въ мѣстѣ сліянія находится кожный придатокъ около 5 мм. длины. Длина каждой ушной раковины 19 мм. Наибольшая ширина ихъ 30 мм. Грудная и брюшная поверхности развиты хуже, чѣмъ у А. Разстояніе между сосками 29 мм.

Расположеніе пупка типичное. Препаратъ не вскрытъ. Доставленъ въ 1873 году въ апрѣлѣ Ленгольдомъ изъ Пензенской губерніи, Норовчатскаго уѣзда, села Панова.

Индивидуальная часть I.



Вторичная передняя поверхность А.

Индивидуальная часть II.
II часть вентральной части



Вторичная передняя поверхность В.

Индивидуальная часть I.

Рис. 24 и 25. Препарат № 16. *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 17. Янусъ несимметричный,
Cephalothoracopagus monosymmetros.

Обозначеніе вторичныхъ поверхностей и индивидуальныхъ частей, какъ у № 8-го. Индивидуальныя части развиты нормально, но несимметрично. Индивидуальная часть I имѣетъ въ длину 32,0 см. Верхнія и нижнія конечности развиты нормально. Полъ женскій, ясно обозначенъ. Заднепроходное отверстіе есть. Индивидуальная часть II имѣетъ въ длину 32,0 см. Верхнія и нижнія конечности, половые органы и заднепроходное отверстіе, какъ у I. Окружность общей головы 30,0 см. Наибольшій затылочный діаметръ 96 мм. Наибольшій лобный — 82 мм.

Вторичное лицо А развито хорошо, и всѣ части его болѣе или менѣе нормальны. Разстояніе между внутренними углами глазъ 13 мм. Разстояніе между наружными углами 33 мм. Ушные раковины одинаковы, имѣютъ въ длину 23 мм. Ротовая щель 11 мм. ширины. Грудная и брюшная поверхности развиты хорошо и выпуклы. Разстояніе между сосками 28 мм.

Вторичное лицо В сильно редуцировано и покрыто волосами вплоть до ушныхъ раковинъ. Послѣднія находятся на срединной плоскости, сдвинуты на шею и соприкасаются своими внутренними краями. Длина каждой ушной раковины 16 мм. Наибольшая ширина 22 мм. Грудная и брюшная поверхности менѣе развиты и недостаточно выпуклы. Разстояніе между сосками 25 мм.

Расположеніе пупка типично. Препараты не вскрыты. Доставленъ въ 1855 г. 12 августа изъ Пермской врачебной Управы.

— 47 —
Индивидуальная часть I.



Индивидуальная часть II.
II часть



Индивидуальная часть I.

Вторичная передняя поверхность А.

Вторичная передняя поверхность В.

Рис. 26 и 27. Препарат № 17. *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 18. Янусь несимметричный;
Cephalothoracopagus monosymmetros.

Обозначеніе вторичныхъ поверхностей и индивидуальныхъ частей, какъ у № 8-го. Индивидуальныя части развиты нормально, но несимметрично. Индивидуальная часть I имѣетъ въ длину 30,0 см. Верхнія и нижнія конечности развиты нормально. Женскіе половые органы и заднепроходное отверстіе есть. — Индивидуальная часть II имѣетъ въ длину 30,0 см. Верхнія и нижнія конечности, половые органы и заднепроходное отверстіе, какъ у I. Слабый намекъ на fovea соссугеа. Окружность общей головы 27,0 см. Наибольшій затылочный діаметръ 78 мм. Наибольшій лобный — 78 мм.

Вторичное лицо А развито нормально и довольно узко. Разстояніе между внутренними углами глазъ 14 мм. Разстояніе между наружными углами 32 мм. Ширина ротовой щели 12 мм. Ушные раковины почти одинаковы и имѣютъ около 20 мм. въ длину. Грудная и брюшная поверхности развиты хорошо. Разстояніе между сосками 28 мм.

Вторичное лицо В покрыто очень скудно тонкими волосами, не имѣетъ никакихъ органовъ. На шеѣ по срединной плоскости находится овальная ямка, окруженная легкой складкой, представляющая зачатки слившихся ушныхъ раковинъ. Грудная и брюшная поверхности развиты нѣсколько слабѣе; разстояніе между сосками 20 мм.

Положеніе пушка типично. Препаратъ не вскрытъ. Происхожденіе неизвѣстно.

— 51 —
Индивидуальная часть I.



Вторичная передняя поверхность А.

Индивидуальная часть II.
III часть конечностей и т.д.



Вторичная передняя поверхность В.

Рис. 28 и 29. Препарат № 18. *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

Индивидуальная часть I.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 19. Янусъ несимметричный,
Cephalothoracopagus monosymmetros.

Обозначеніе вторичныхъ поверхностей и индивидуальныхъ частей, какъ у № 8-го. Индивидуальныя части развиты нормально, но не вполне симметрично. Индивидуальная часть I имѣетъ въ длину 35,5 см. Верхнія и нижнія конечности, женскіе половые органы и заднепроходное отверстіе нормальны. Индивидуальная часть II имѣетъ въ длину также 35,5 см. Верхнія и нижнія конечности, половые органы и заднепроходное отверстіе, какъ у I. Окружность общей головы 31,0 см. Наибольшій затылочный діаметръ 92 мм. Наибольшій лобный — 90 мм.

Вторичное лицо А имѣетъ вполне нормальный видъ и не такъ широко, какъ у другихъ уродовъ. Разстояніе между внутренними углами глазъ 13 мм. Разстояніе между наружными углами 26 мм. Ширина ротовой щели 17 мм. Ушныя раковины имѣютъ различную длину: правая достигаетъ 29 мм., лѣвая — 24 мм. Грудная и брюшная поверхности развиты хорошо и выпуклы. Разстояніе между сосками 33 мм.

Вторичное лицо В все покрыто волосами и не имѣетъ никакихъ слѣдовъ отдѣльныхъ частей. Въ верхней части его находится громадный грыжевой мѣшокъ, мягкій на ощупь, въ діаметрѣ около 5,0 см. Грудная и брюшная поверхности менѣе развиты и не такъ выпуклы. Разстояніе между сосками 31 мм.

Расположеніе пупка типичное. Препаратъ не вскрытъ. Происхожденіе неизвѣстно.



Вторичная передняя поверхность А.



Вторичная передняя поверхность В.

Рис. 30 и 31. Препарат № 19. *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

№ 20. Янусь несимметричный,
Cephalothoracopagus monosymmetros.

Обозначение вторичныхъ поверхностей и индивидуальныхъ частей, какъ у № 8. Индивидуальныя части развиты хорошо, но несимметрично. Индивидуальная часть I имѣетъ въ длину 29,5 см. Верхнія и нижнія конечности, женскіе половые органы и заднепроходное отверстіе развиты хорошо. Индивидуальная часть II имѣетъ въ длину также 29,5 см. Верхнія и нижнія конечности, женскіе половые органы и заднепроходное отверстіе такіе же, какъ у I. Слабый зачатокъ *foveae соссугеае*. Окружность общей головы 25,0 см. Наибольшій затылочный діаметръ 72 мм. Наибольшій лобный діаметръ 84 мм.

Вторичное лицо А развито нормально. Разстояніе между внутренними углами глазъ 16 мм. Разстояніе между наружными углами 35 мм. Ширина ротовой щели 16 мм. Ушныя раковины одинаковы, около 20 мм. Грудная и брюшная поверхности развиты очень хорошо. Разстояніе между сосками 34 мм.

Вторичное лицо В слабо покрыто тонкими и короткими волосами и не имѣетъ никакихъ признаковъ отдѣльныхъ частей. Грудная и брюшная поверхности развиты хуже. Разстояніе между сосками 25 мм.

Положеніе пупка типично. Препаратъ не вскрытъ. Происхожденіе неизвѣстно.


Индивидуальная часть I.



Вторичная передняя поверхность А.

Индивидуальная часть II.

Индивидуальная часть II.



Вторичная передняя поверхность В.

Рис. 32 и 33. Препарат № 20. *Cephalothoracopagus monosymmetros*.

как
Инди-
ности,
рошо.
вжия
е же,
ловы
бный
ним
мм.
мм.
жгу
и не
но-
не-